

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:**

La ingestión o la absorción por la piel de este producto puede ser peligrosa e incluso fatal. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, agua potable o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces y vida salvaje. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.

**MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:**

Este producto es un raticida anticoagulante de segunda generación, cuyo ingrediente activo es la bromadiolona el cual elimina eficazmente ratas y ratones. Los roedores pueden consumir dosis letales en una sola ingestión, produciéndoles la muerte por hemorragias internas y anemia aguda después de 4 a 5 días del consumo, sin despertar recelo.

CONTRAC ALL-WEATHER BLOX se usa tal y como viene formulado. Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

Dosis: Contra ratas, coloque de 3 a 16 bloques de cebo por postura a intervalo de 15 a 30 pies lineales. Contra ratones, coloque 1 bloque por postura a intervalo de 8 a 12 pies lineales. Dos bloques de cebo pudieran ser necesarios en lugares de alta actividad de los ratones. Se aplica cuando se observa la presencia de los roedores o los daños causados por éstos. En ambos casos, debe mantenerse un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que hayan cesado los signos de actividad de los roedores. Recupere los restos de cebo deteriorado o contaminado, así como los animales muertos y destrúyalos quemándolos y/o enterrándolos, lejos de fuentes de agua.

**NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:**

**NOMBRE VULGAR**

Rata de tejado  
Rata Norway  
Ratón casero

**NOMBRE CIENTÍFICO**

Rattus rattus.  
Rattus norvegicus  
Mus musculus

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA**

**CONTRAC ALL-WEATHER BLOX 0.005 BB  
RODENTICIDA-COUMARINA  
BROMADIOLONA**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA: % P/P**

**Ingrediente Activo:**  
3-[3-(4'-4-bromobifenilil)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-  
4-hidroxi-coumarina.....0.005  
**Ingredientes Inertes:** .....99.995  
**TOTAL.....100.000**

Contiene 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

**Contenido neto:** \_\_\_\_\_ kilogramos.

# PRECAUCIÓN

## ANTÍDOTO: VITAMINA K

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

**PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

**Por ingestión:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

**Por inhalación:** Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

**Por contacto con los ojos:** Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

**Por contacto con la piel:** Quitese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

**Antídoto y tratamiento médico:** El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

**NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

BELL LABORATORIES, INC. Madison, WI 53704, USA.

**PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:**

**PAÍS NO. REG. FECHA DE REG.**

USA  
REP. DOMINICANA

**NUMERO DE LOTE:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE FORMULACIÓN:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_