



DISTRIBUIDORA  
SUPERIOR DOMINICANA

Tu Proveedor de Soluciones

# FRASGRAC RODENTICIDA

## FICHA TÉCNICA

**TIPO:** RODENTICIDA.

**INGREDIENTE ACTIVO:** BROMETALINA.

**GRUPO QUIMICO:** ANILINA.

**CONCENTRACION:** 0.005%.

**FORMULACION:** BLOQUE EXTRUIDO.

**MODO DE ACCION:** INGESTION Y ARBSOCION

**CATEGORIA TOXICOLOGIA:** MODERADAMENTE PELIGROSO.

**ANTIDOTO:** NO TIENE.

**PRESENTACION:** CUBETA DE 18 LBS (BLOQUES), SOBRE DE 43 GRAMOS PELETIZADO.

### **BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:**

- FUERTE PODER DE DERRIBE.
- LAS RATAS NORUEGA, RATAS DE TECHOS Y EL RATON CASERO PARAN DE ALIMENTARSE INMEDIATAMENTE CONSUME LA DOSIS LETAL.
- BLOQUES PARAFINADOS RESISTENTES A HUMDEDAD Y HONGOS.

### **RECOMENDACIONES DE USO:**

- USAR EN LUGARES, MOJADOS O SECOS, EN LOS QUE SE NECESITE USAR CEBO.
- PUEDE USARSE EN AREAS INTERIORES, EXTERIORES Y EN AREAS CON ALTA HUMEDAD.

- PARA LOGRAR UNA LIMPIEZA TOTAL MAS RAPIDO QUE CON CEBOS DE ANTICUAGULANTES.
- CUANDO SE USA EL PRODUCTO PELETIZADO EN SOBRES, SE FACILITA LA COLOCACION DEL MISMO. SE RECOMIENDA MANTENER EL CEBO FRESCO.

#### **MODO DE EMPLEO:**

- EL RODENTICIDA FRASTRAC SE USA TAL Y COMO VIENE FORMULADO. DEBE SER COLOCADO EN LUGARES QUE SE ENCUENTEN A LO LARGO DE LAS PAREDES, CERCANOS A ABERTURAS RAÍDAS, EN ESQUINAS O LUGARES OCULTOS, ENTRE PISOS Y PAREDES, AREAS CERCANAS A SUS MADRIGUERAS Y/O EN LUGARES DONDE SE OBSERVE PRESENCIA DE LOS ROEDORES, TALES COMO EXCREMENTOS, PELOS, HUELLAS O MANCHAS GRASOSAS PRODUCIDAS POR ROEDORES.

#### **DOSIS:**

- CONTRA RATAS, COLOQUE DE 2-10 BLOQUES DEL PRODUCTO A INTERVALOS DE 5 – 10 METROS LINEALES. CONTRA RATONES, COLOQUE UN BLOQUE CADA 2-4 METROS LINEALES. EN AMBOS CASOS DEBE MANTENERSE UN SUMINISTRO ININTERRUMPIDO DE CEBO FRESCO DURANTE 10-15 DIAS O HASTA QUE HAYAN CESADO LOS SIGNOS DE ACTIVIDAD DE LOS ROEDORES.
- NOTA: RECUPERE LOS CEBOS DETERIORADOS O CONTAMINADOS, ASI COMO LOS ANIMALES MUERTOS Y DESTRUYALOS QUEMANDOLOS Y/O ENTERRANDOLOS LEJOS DE FUENTES DE AGUA.

#### **SINTOMAS DE INTOXICACION:**

- ES AFECTADO EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PUEDEN PRESENTARSE SINDROME DE UN PARALISIS, COMENZANDO CON DEBILIDAD EN LAS PIERNAS Y ATAXIA SEGÚN PROGRESA, APARECE DEPRESION, TEMBLORE, PARALISIS REFLEJA DE LAS PIERNAS Y PERDIDA DE LA PERCEPCION OTROS SINTOMAS INCLUYEN VOMITO, ANOREXIA, RECUMBENCIA LATERAL, ATAQUES Y COMA.

#### **PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MEDICO:**

- POR INGESTION: DE A BEBER AL INTOXICADO TRES CUCHARADAS DE CARBON ACTIVADO EN MEDIO VASO DE AGUA. SI NO TIENE CARBON ACTIVADO DELE A BEBER CLARA DE HUEVO CON UN POCO DE AGUA (8 PARA ADULTOS, 4 PARA NIÑOS). BUSQUE ATENCION MÉDICA.

- POR INHALACION: RETIRE LA PERSONA AFECTADA DEL AREA CONTAMINADA Y LLEVELA AL AIRE FRESCO. OBTENGA ATENCION MÉDICA.
- POR CONTACTO CON LOS OJOS: LAVELOS CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA DURANTE 15 MINUTOS POR LO MENOS. BUSQUE ATENCION MÉDICA.
- POR CONTACTO CON LA PIEL: QUITESE LA ROPA Y/O ZAPATOS CONTAMINADOS Y LAVE LA ZONA AFECTADA CON SUFICIENTE AGUA Y JABON. OBTENGA ATENCION MÉDICA.
- ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: EL ANTIDOTO ES VITAMINA K. ADMINISTRELA A DOSIS DE ADULTO Y MAYORES DE 12 AÑOS 15-25 MG/DIA (ORAL), 10-50 MG/DIA (ORAL), 1-5 MG/DIA (SC-IM), 0.6 MG/KG/DIA (IV).