

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO



PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

LIQUA-TOX II 0.106 SL RODENTICIDA-INDANDIONA DIFACINONA

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: VITAMINA K

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un raticida anticoagulante de dosis múltiple cuyo ingrediente activo es la difacinona el cual elimina eficazmente ratas y ratones. Proporciona excepcional control en lugares bajo condiciones de ausencia de agua o cuando la comida está disponible, pero el agua es limitada, tales como elevadores de grano y cuartos de almacenamiento de comida. LIQUA-TOX II O.106 SL se usa mezclado con agua en proporción de un sobre de producto formulado (1.68 onzas fluidas) en 32 onzas fluidas de agua.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

LIQUA-TOX, se usa tal y como viene formulado.
No se usan equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

LIQUA-TOX, se usa tal y como viene formulado. Use siempre equipo de protección personal para manejar este producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

PLAGA QUE CONTROLA:

Nombre Común	Nombre Científico
Rata de tejado	<u>Rattus rattus.</u>
Rata Norway	<u>Rattus norvegicus</u>
Ratón casero	<u>Mus musculus</u>

Dosis: Contra ratas, provea un mínimo de una pinta (16 onzas fluidas) de la mezcla de LIQUA-TOX y agua en cada envase. Si el área infestada es grande, y la población de roedores parece ser alta, coloque envases en varios puntos. Espacie los envases con el cebo líquido y llénelos de nuevo según sea necesario. Contra ratones, provea media pinta (8 onzas fluidas) de la mezcla por postura a intervalo de 8 a 12 pies lineales, en envases apropiados. Reemplace el cebo contaminado o deteriorado inmediatamente. Recoja y desheche correctamente los animales muertos y el cebo dañado. Mantenga el tratamiento mientras sea necesario para el control de las especies blanco.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Puede repetirse tantas veces se presente la re infestación.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No aplica.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

No se requiere.

FITOTOXICIDAD:

No aplica.

COMPATIBILIDAD:

No debe mezclarse con ningún producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacénesse y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN:

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL:

Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN:

Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS:

Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-7828.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben ser sometidos a triples lavados, luego "perforarlos" y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

MANUFACTURADO Y EXPORTADO POR:

BELL LABORATORIES, INC
3699 KINSMAN BLVDMADISON, WI 53704. EU

REGISTRADO E IMPORTADO POR

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.
Avenida Isabel Aguiar Nº 131-5-A. Zona Industrial de
Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.

ESTADOS UNIDOS

REP. DOM.