

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FIRSTSTRIKE SOFT BAIT 0.0025 RB RODENTICIDA-COUMARINA DIFETHIALONE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente Activo:

3-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(4'-(4-bromobifenil)-1,2, 3,4-tetrahidro-1-naftil-4-hidroxi-1-(2-benzoatinona)....0.0025

Ingredientes Inertes:99.9975

%m/m

Contiene: 0.025 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: ()7.3 KG ()1.8 kg ()2.5 kg ()5 kg ()10 kg

PRECAUCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

ANTÍDOTO: VITAMINA K

FABRICADO Y FORMULADO POR:

LIPHATECH, INC

3600 W. ELM STREET, MILWAUKEE, WI 53209, EU.

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.

Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo República Dominicana

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENCILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS. NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

**PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS**

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O
CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.**

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

PAÍS

USA – EPA No.

REP. DOMINICANA

NO. REG.

7173-258

8124

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: