

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:

La ingestión o la absorción por la piel de este producto puede ser peligrosa e incluso fatal. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, agua potable o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces y vida salvaje. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.

MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

MAKI MINI BLOCKS se usa tal y como viene formulado. En áreas urbanas puede usarse en casas, edificios industriales, comerciales y públicos, además de sus áreas circundantes. También puede usarse en vehículos de transporte (embarcaciones, trenes, aviones), puertos o terminales y calles angostas. No lo use en alcantarillados. En áreas no urbanas, puede usarse en el interior de casas y construcciones agrícolas. Determine las áreas donde es más probable que encuentren y consuman el cebo las ratas y/o ratones. En general, es a lo largo de paredes, junto a aberturas mordidas, dentro de madrigueras o junto a ellas, en rincones y lugares ocultos, entre pisos y paredes o en ubicaciones donde se hayan visto roedores o señales de su presencia. No ponga el cebo en áreas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que tomen contacto directo con ellos. No esparza el cebo y protéjalo de la lluvia y la nieve. Retire todos los alimentos alternativos que sea posible.

Dosis. Contra ratas, coloque de 3 a 16 Mini Bloques Maki de una onza en cada ubicación. Separe los trozos a 15 o 30 pies de distancia en las áreas infestadas. Contra ratones, coloque 1 Mini Bloque Maki de una onza por colocación típica. Separe las colocaciones a intervalo de 8 a 12 pies lineales. Se aplica cuando se observa la presencia de los roedores o los daños causados por éstos. En ambos casos, debe mantenerse un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que hayan cesado los signos de actividad de los roedores. Recupere los restos de cebo deteriorado o contaminado, así como los animales muertos y destrúyalos quemándolos y/o enterrándolos, lejos de fuentes de agua.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:
NOMBRE VULGAR **NOMBRE CIENTÍFICO**
Rata de tejado Rattus rattus.
Rata Norway Rattus norvegicus
Ratón casero Mus musculus

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA

MAKI MINI BLOCKS 0.005 BB RODENTICIDA-COUMARINA BROMADIOLONA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	% P/P
Ingrediente Activo:	
3-[3-(4'- 4-bromobifenilil)-3-hidroxi-1 fenilpropil]-	
4-hidroxi-coumarina.....	0.005
Ingredientes Inertes:	99.995
TOTAL	100.000

Contiene 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: _____ kilogramos.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: VITAMINA K

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Por ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

Antídoto y tratamiento médico: El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

LIPHATECH
3600 W. Elm Street, Milwaukee, WI 53209
Tel. (414) 351-1476
USA

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
------	----------	---------------

USA	7173-202	
-----	----------	--

REP. DOMINICANA

NUMERO DE LOTE: _____

FECHA DE FORMULACIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____