

## PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

**PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

### FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENCILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** El antídoto es Vitamina K. Tratamiento: Adultos y niños mayores de 12 años, aplicar 15 - 25 mg vía oral y de 5 - 10 mg/día por vía intramuscular. Si existe una hemorragia severa, 10 mg IV cada 12 -24 horas. En niños menores de 12 años, 5 - 10 mg por vía oral y de 1 - 5 mg/día IM. En casos severos, 0.6 mg/kg/día. En caso de hemorragia severa, el tratamiento debe complementarse con transfusión sanguínea o plasma fresco.

## RESOLV SOFT BAIT 0.005 RB

### RODENTICIDA-COUMARINA

### BROMADIOLONA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	%m/m
<b>Ingrediente Activo:</b>	
3-[3-(4'-4-bromobifenilil)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-	
4-hidroxi-coumarina.....	0.005
Ingredientes Inertes.....	99.995

Contiene 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

**Contenido neto: ( )1.8 kg ( )5 kg ( )7.3 kg ( )10 kg**

# PRECAUCIÓN

## ANTÍDOTO: VITAMINA K

### FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

LIPHATECH, INC  
3600 W. ELM STREET, MILWAUKEE, WI 53209, EU.

### REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.  
Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Este producto es un raticida anticoagulante de segunda generación, cuyo ingrediente activo es la Bromadiolona. Los roedores pueden consumir dosis letales en una sola ingestión, produciéndoles la muerte por hemorragias internas y anemia aguda después de 4 a 5 días del consumo, sin despertar recelo. La sustancia activa actúa interfiriendo con la síntesis de protrombina que interrumpe los mecanismos normales de coagulación de la sangre al causar un aumento de la tendencia a sangrar.

**DOSIS RECOMENDADA:** Cada paquete contiene 0.42 onzas (12 gramos). **Ratones domésticos (Bigañuelos):** Aplique un paquete por punto de colocación, cada 8 a 12 pies (2.5 a 3.7 metros) aparte. Puede que se necesiten hasta cuatro paquetes en puntos donde haya una actividad muy alta de ratones. Mantenga un suministro constante de cebo fresco durante 15 días o hasta que cesen las señales de actividad de ratones domésticos. **RATAS O RATONES:** Aplique entre 7 a 36 paquetes de 12 gramos por punto de colocación, cada 15 a 30 pies (4.5 a 9 metros) aparte. Mantenga un suministro constante de cebo fresco durante 10 días o hasta que cesen las señales de actividad de ratas. El cebo se puede sacar de la bolsa y colocar en un comedero o trampa en la que quede asegurado. Deseche la envoltura vacía de manera apropiada y siguiendo las regulaciones establecidas.

### PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre Común	Nombre Científico
Rata de tejado	<i>Rattus rattus.</i>
Rata norway	<i>Rattus norvegicus</i>
Ratón casero	<i>Mus musculus</i>

### PROTECCION AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

<b>PAÍS</b>	<b>NO. REG.</b>
USA - EPA No.	7173-297
REP. DOMINICANA	8116
<b>NUMERO DE LOTE:</b>	
<b>FECHA DE FORMULACIÓN:</b>	
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	