

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENCILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal. Alteración del Sistema Nervioso Central. Neumonía química por aspiración

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Los síntomas son de acuerdo a los síntomas que predominen, si es el IPBC, el antídoto es sulfato de atropina. Adminístrese por vía intravenosa o por inyección muscular si no es posible por la primera vía. La dosis es de 0.4 a 2.0 mg (adultos) y 0.05 mg/kg de peso corporal (niños menores de 12 años) repetidos cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Mantenga la atropinización mediante dosis repetidas por un mínimo de 72 horas, según la gravedad del envenenamiento. Si son los demás ingredientes no tiene antídoto, dar tratamiento se soporte.

MASSOCIDE FUSTOL N 0.76 SC

INSECTICIDA-FUNGICIDA- CARBAMATO, CONAZOLE, PIRETROIDE
IPBC + TEBUCONAZOL+ PERMETRINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

%M/V

Ingrediente Activo:

Tebuconazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan 3-ol.....0.20
Permetrina	m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.....0.06
IPBC	3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate; 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate; Iodocarb.....0.50

Ingredientes Inertes.....79.64

Contiene 7.6 gramos de ingrediente activo por LITRO de producto comercial.

DENSIDAD: 0.804 kg/l a 20° C

Contenido neto: 1L / 3.785L / 5 L

CUIDADO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

COMERCIAL QUIMICA MASSO.

VILADOMAT 321, 5ª planta, 0829, BARCELONA, ESPAÑA.

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.

Av. Isabel Aguiar Nº 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana

INSTRUCCIONES DE USO: Uso doméstico y uso profesional. Insecticida/fungicida para uso doméstico/profesional contra diversos tipos de plagas/enfermedades de la madera: Massocide FUSTOL N es un producto formulado en líquido listo para usar, para aplicar por brocheo, pulverización o por inyección sobre madera. Puede ser aplicado como producto curativo o preventivo. No trate áreas donde los alimentos estén presentes. Ni sobre utensilios que pueden llegar a estar en contacto con los alimentos. No aplicar cuando las instalaciones estén en operación, ni a los animales directamente.

DOSIS RECOMENDADA: Producto listo uso. Aplicar en presencia o previsión de plaga. Si es necesario re-aplicar a los 5 años. **Tratamiento preventivo:** 1lt de producto por cada 5 M2 y 2 aplicaciones, con dos horas de intervalo entre la primera y la segunda aplicación. **Tratamiento curativo:** 1lt de producto por cada 5 M2 y 3 aplicaciones, con dos horas de intervalo en cada aplicación. **Tratamiento por inyección:** hacer perforaciones de 9 mm de diámetro, distanciadas a 30 cms (12") y una profundidad de ½ a ¾ del espesor de la madera. Inyectar varias veces con 2 horas de intervalo entre inyecciones. Finalmente sellar los agujeros.

PLAGAS QUE CONTROLA:

N. Común	Nombre científico
Corticoides Pudrición seca Pudrición cafe	<i>Coniophora puteana</i> <i>Poria placenta</i> <i>Gloeophyllum trabeum</i>
Hongos del azulado Muerdago comun	<i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Sydowia polyspora</i>
Carcoma Termitas de madera	<i>Hyloterpes bajulus</i> <i>Kaloterms flavicollis</i>

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

MANEJO DE ENVASES



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

PAÍS
ESPAÑA
REP. DOMINICANA
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO. REG.
7491